



Fresubin® 5 kcal Shot

Fettemulsjon for effektiv tilførsel av energi

Svært energirik vegetabilsk fettemulsjon for tilførsel av mye energi i et lite volum. Til ernæringsbehandling av pasienter med eller i risiko for underernæring, spesielt ved høyt energibehov og lav volumtoleranse.

Energirik med 5 kcal/ml

Inneholder rapsolje og MCT for tilførsel av essensielle og lett absorberbare fettsyrer¹

Liten flaske på kun 120 ml

Dosering: 30 ml opptil 4 ganger om dagen

Vegansk

Fresubin 5 kcal Shot

Tilgjengelig i 120 ml EasyBottle



Gjennomsnittlig næringsinnhold

		30 ml	100 ml	120 ml
Energi	kcal (kJ)	150 (630)	500 (2100)	600 (2520)
Fett	g	16,1	53,8	64,6
hvorav mettede fettsyrer	g	5	16,7	20,04
hvorav triglyserider av middels kjedelengde (MCT)	g	4,2	13,9	16,7
hvorav enumettede fettsyrer	g	7,4	24,6	29,5
hvorav flerumettede fettsyrer	g	3,8	12,5	15
hvorav linolsyre	g	2,50	8,34	10,0
hvorav α -linolensyre	g	1,09	3,63	4,36
hvorav kolesterol	g	0	0	0
Karbohydrater	g	1,2	4,0	4,8
hvorav sukkerarter	g	1,2	4,0	4,8
hvorav laktose	g	0	0	0
Fiber	g	0,12	0,4	0,48
hvorav løselige	g	0,03	0,1	0,12
hvorav uløselige	g	0,09	0,3	0,36
hvorav fermenterbare	g	0,004	0,01	0,014
Protein	g	0	0	0
Salt (Na x 2,5)	g	0	0	0
Vann	ml	12	40	48
Vitaminer				
Vitamin E	mg α -TE°	4,2	14,0	16,8
Vitamin K ₁	μ g	11,4	38,0	45,6

Energiprosentfordeling (E%)

Fett	Karbohydrater	Fiber	Protein
96,8 E%	3,2 E%	0 E%	0 E%

° α -TE= alfatokoferolekvivalenter

Forskrivningsinformasjon

Næringsmiddel til spesielle medisinske formål:

Energirik (5 kcal/ml) fettemulsjon med langkjedede triglyserider og MCT. Laktosefri. Glutenfri. Til ernæringsbehandling av pasienter med eller i risiko for sykdomsrelatert underernæring, spesielt ved høyt energibehov og lav volumtoleranse. For oral tilførsel.

Dosering:

Skal vurderes ut i fra pasientens behov av relevant helsepersonell. Anbefalt dosering som supplerende ernæring er 3-4 x 30 ml (450-600 kcal) per døgn. Inntaket bør ikke overstige 50 % av pasientens totale energibehov.

Viktig informasjon:

Skal anvendes under medisinsk kontroll. Ikke egnet som eneste næringskilde. Ikke egnet til barn < 3 år. **Ikke for parenteral (I.V) bruk.**

Lagring og håndtering:

Oppbevares ved romtemperatur. Åpnet flaske kan oppbevares inntil 14 dager i kjøleskap under hygieniske forhold. Drikkes langsomt. Pakket i beskyttende atmosfære.

Kontraindikasjoner:

Skal ikke benyttes dersom enteral ernæring er kontraindisert, som ved akutt gastrointestinal blødning, ileus og sjokk. Brukes med forsiktighet ved alvorlig organsvikt med forstyrret metabolisme og ved alvorlige former for nedsatt fordøyelse og absorpsjon. Ikke egnet for pasienter med medfødt manglende evne til å metabolisere noen av næringsstoffene i Fresubin 5 kcal Shot.

Flerkulturell egnethet:

Fresubin 5 kcal Shot er halalsertifisert* og koshercertifisert. Sertifikat kan fremvises på forespørsel.

* Med unntak av smaken Sitron.

Ingredienser

Vann, rapsolje, triglyserider av middels kjedelengde (MCT), sukrose, emulgator (E 472c), stabilisatorer (E 460, E 466)*, aromater*, fortykningsmiddel (E 415).

* Mengde avhengig av smak

Kjente FODMAPs per 100 ml

Ingen

Smaker

Sitron, Nøytral

1) Babayan VK (1986). Medium chain triglycerides and structured lipids. *Lipids* 1986; 6(7): 26-29.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen, 0405 Oslo
Telefon 22 58 80 00
markedsavdelingen@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/no