



Abbott

ENKELT ER EFFEKTIVT.

## AFINION™ HbA1c

Pasientkonsultasjoner uten lab-resultater er utfordrende og lite effektive. Pasientnær HbA1c-testing kan bedre effektiviteten, og føre til økt motivasjon og tilfredshet for pasienten.<sup>1-4</sup>

- 3 minutter testtid
- Resultater med laboratoriekvalitet
- Ingen interferens fra vanlige Hb-varianter
- NGSP- og IFCC-sertifisert



# Afinion™ HbA1c

## FAKTA

Afinion HbA1c er en enkel fingerstikktest som gir pasientens HbA1c-verdi på minutter i løpet av konsultasjonen.

- 1,5 µl prøvevolum
- Kapillært og venøst fullblodsprøvemateriale
- Måleområde: 4–15 % HbA1c, 20–140 mmol/mol HbA1c
- Oppbevaring i romtemperatur i 3 måneder
- Bruksklare kontroller på 2 nivåer

## HbA1c TESTING

Afinion HbA1c-test på 3 minutter passer perfekt inn i arbeidsflyten:

«Pasientnær HbA1c testing er en mulighet til forbedret behandling av mennesker med diabetes».

—Egbunike V et. al. *Diabetes Educator*. 2013;39:66-73.

«Pasientnær testing for HbA1c gir mulighet for mer tidsriktige behandlingsendringer».

—ADA. *Diabetes Care* 2018;41(Suppl. 1):S55–S64.

## 3-TRINNS PROSEODYRE

**1** Ta prøven med den integrerte prøvetakeren.



**2** Sett prøvetakeren tilbake i testkassetten.



**3** Sett testkassetten inn i analysatoren og lukk lokket. Prosesseringen starter automatisk.



## IDF ANBEFALINGER

Anbefalinger fra Den internasjonale diabetesföderasjonen (IDF) for bruk av HbA1c ved diabetes type 2<sup>5</sup>

- Kriterier for diagnose: HbA1c ≥ 6,5 % eller HbA1c ≥ 48 mmol/mol
- Gi HbA1c-resultat, målt enten pasientnært eller på laboratoriet, før den kliniske konsultasjonen.
- Mål HbA1c hver 2. til 6. måned, avhengig av nivået, blodglukosekontroll stabiliteten og endringer i behandlingen.

## TILGJENGELIGE TESTER

- AFINION™ ACR
- AFINION™ CRP
- AFINION™ HbA1c
- AFINION™ LIPID PANEL

1. Shepard MD. Clin Biochem Rev. 2006;27(3):161-70.  
2. Laurence CO, Gialamas A, Bubner T. Br J Gen Pract. 2010;60(572):e98-e104.  
3. Miller CD, Barnes CS, Phillips LS, et al. Diabetes Care. 2003;26(4):1158-63.  
4. Crocker JB, Lee-Lewandrowski E, Lewandrowski N, et al. Am J Clin Pathol. 2014;142:640-6  
5. Global Guideline for Type 2 Diabetes, IDF, 2012. ISBN 978-92-90229-43-8.

© 2019 Abbott. Med enerett. Afinion er et varemerke som tilhører Abbott-konsernet. Alle andre varemerker det er henvis til, er varemerker som tilhører sine respektive eiere. CVD185857 10004100-02 01/19